Stophylinidæ (col.) de République Centrafricoine
Description de genre et d'espèces nouveaux

par **Louis LEVASSEUR** (1)

■

Nos collections nationales et privées ne possèdent qu'un matériel faible, au moins en Staphylinides, provenant des territoires formant la République Centrafricaine. Pourtant, cette région partage avec le Tchad le privilège d'être un carrefour de faune et présente de ce fait un intérêt incontestable.

En 1964, M. CARAYON, au cours d'un très bref séjour, et en 1966, MM. PUJOL et TEOCCHI, pendant plusieurs mois, ont récolté un important matériel dont ils ont bien voulu me confier l'étude.

L'inventaire de ces Staphylins provient en totalité de la région forestière de La Maboké située en Lobaye à 130 km au sud-ouest de Bangui, à 3°7 de latitude Nord et 17°55 de longitude Est.

La présente note a pour objet de préciser dès maintenant la distribution de nombreuses espèces et de décrire quelques nouveautés. Un grand nombre d'exemplaires sont encore en cours d'étude. Certains, uniques, attendent confirmation ; d'autres ne pourront être nommés ou décrits qu'après une révision complète de certaines sous-familles et dépendent des travaux de mes collègues étrangers, notamment MM. FAGEL et LAST qui, comme moi-même, sont submergés par les demandes de collaboration.

Si peu des nombreuses espèces récoltées par M. TEOCCHI apparaissent dans ces pages, c'est que ces insectes, pour la plupart des *Aleocharinæ* capturés dans les colonnes de *Dorylus*, sont confiés à M. KISTNER aux U.S.A. qui en révise les genres et espèces.

Actuellement, MM. PUJOL et TEOCCHI continuent les récoltes en République Centrafricaine dans des zones savanicoles et forestières et l'étude taxinomique du matériel fera l'objet de prochaines notes dans ces Cahiers.

Famille : *STAPHYLINIDÆ*

Sous-famille : *Piestinæ*

Eleusis alutella Fauvel

DISTRIBUTION : Nigeria, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo ex-belge, Uganda, Kenya, Tanganyika, Mozambique, Madagascar (d'après Scheerpeltz).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Maboké, VII-1966, coupe de *Triplochiton scleroxylon* K. Schum., 2 ex. (Pujol).

(1) Contribution à la connaissance des Coléoptères Staphylinidés d'Afrique noire (15e note)

Source MNHN, Paris

Eleusis mutica Bernhauer

DISTRIBUTION : Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo ex-belge (d'après Scheerpeltz).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, coupe de *Triplochiton scleroxylon* K. Schum., 1 ex. (Pujol).

Holosus schoutedeni Bernhauer

DISTRIBUTION : mal précisée, Afrique équatoriale.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, V-1966, U.V., 3 ex. (Pujol et Teocchi).

Holosus strigosus Cameron

DISTRIBUTION : Afrique équatoriale, connu du Natal et de l'Erythrée.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, V-1966, U.V., 14 ex. (Pujol et Teocchi).

Lispinus imperialis Bernhauer

DISTRIBUTION : mal précisée, décrit du Congo ex-belge, Gabon, Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, V-1966, U.V., 3 ex. (Pujol et Teocchi).

Sous-famille : *Pæderinæ*

Phinopilus uelensis Bernhauer

DISTRIBUTION : Congo ex-belge (Type), Kenya.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, V-1966, U.V., 2 ex. (Pujol et Teocchi).

Phinopilus bechynei Scheerpeltz

DISTRIBUTION : Guinée, Côte-d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun, Congo ex-belge.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, V-1966, U.V., 6 ex. (Pujol et Teocchi).

Pinoritus machadoi Fagel

DISTRIBUTION : Angola (Type), Katanga, Cameroun.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, V-1966, U.V., 1 ex. (Pujol et Teocchi).

Pinoritus inexpectatus Fagel

DISTRIBUTION : Rhodésie, Katanga, Congo ex-belge (Type), Kenya, Cameroun.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, V-1966, U.V., 9 ex. (Pujol et Teocchi).

Source : MNHN, Paris

Pinoritus collarti Fagel

DISTRIBUTION : Guinée, Ghana, Nigeria, Ruanda, Congo (Brazzaville), Congo ex-belge (Type), Katanga.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Maboké, V-1966, U.V., 4 ex. ; VII-1966, U.V., 4 ex (Pujol et Teocchi).

Pinoritus turbatus Fagel

DISTRIBUTION : Guinée, Côte-d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Congo ex-Belge (Type).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Maboké, VII-1966, U.V., 4 ex. (Pujol et Teocchi).

Pinophilus freyi Scheerpeltz

DISTRIBUTION : Guinée, Côte-d'Ivoire, Nigeria, Gabon.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Maboké, V-1966 U.V., 2 ex. (Pujol et Teocchi).

Gridellius sthulmanni Bernhauer

DISTRIBUTION : Guinée, Côte-d'Ivoire, Uganda, Tchad, Congo (Brazzaville), Congo ex-belge, Rhodésie, Cameroun.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Maboké, V-1966, U.V., 4 ex. ; VI-1966, U.V., 20 ex. (Pujol et Teocchi)

Jarrigeus laticeps Fagel

DISTRIBUTION : Gabon (Type), Congo (Brazzaville).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Maboké, VIII-1966, U.V., 1 ex. (Pujol et Teocchi).

Paederus sabaeus Erichson

DISTRIBUTION : toute l'Afrique noire, l'Egypte, atteignant même la péninsule arabique (Fagel).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Maboké, diverses dates, nombreux exemplaires (Carayon, Pujol et Teocchi).

Paederus congoensis Bernhauer

DISTRIBUTION : Guinée, Sierra Leone, Côte-d'Ivoire, Congo ex-belge, Cameroun.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Maboké, VI-1966, U.V., 4 ex. (Pujol et Teocchi).

Stilicus (Eurystilicus) quadrimaculatus Fauvel

DISTRIBUTION : Usambara, Cameroun, Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Maboké, VII-1966, coupe de *Cola cordifolia* (Cav.) R. Br., 1 ex. (Pujol).

Source MNHN, Paris

Stilicus (Mirostilicus) anommataphilus Wasmann

DISTRIBUTION : Congo ex-belge (Type).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè. 23-VI-1966, dans une colonne de *Dorylus*, 1 ex. (Teocchi).

Cryptobium (s.lato) bicoloriceps Fagel (*in litteris*)

DISTRIBUTION : l'espèce m'était connue de Côte-d'Ivoire, du Cameroun de l'Uganda, du Kenya et du Congo (Brazzaville).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, U.V., 1 ex. (Pujol et Teocchi).

" Scimbalium " uelense Bernhauer

DISTRIBUTION : Côte-d'Ivoire, Nigeria, Tchad, Congo ex-belge (Type).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, U.V., 2 ex. (Pujol et Teocchi).

Nota : Cette espèce, décrite comme *Scimbalium*, est en fait un *Cryptobium* (*sensu lato*) à antennes non coudées, à 1er article plus court que de coutume (Fagel).

Sous-famille : *Xantholininæ*

Thyreocephalus semipiceus Bernhauer

DISTRIBUTION : Côte-d'Ivoire, Nigeria, Uganda, Congo (Brazzaville), Tanganyika (Type).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, V-1966, U.V., 1 ex ; VII-1966, U.V. 2 ex. (Pujol et Teocchi).

Nota : Tous les individus que je possède ont été capturés au piège lumineux

Sous-famille : *Staphylininæ*

Hesperus mirus Bernhauer

DISTRIBUTION : Cameroun (Type).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè VII-1966, coupe de *Triplochiton scleroxylon* K. Schum., 1 ex. (Pujol).

Hesperus strigiventris Eppelsheim

DISTRIBUTION : Guinée, Togo, Congo (Brazzaville), Katanga.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VI-1966, U.V., 1 ex. ; VII-1966, coupe de *Cola cordifolia* (Cav.) R. Br. (Pujol), 4 ex.

Diatrechus rotschildi Bernhauer

DISTRIBUTION : Guinée, Cameroun, Katanga, Éthiopie (Type).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VIII-1966, U.V., 1 ex. (Pujol et Teocchi).

Source MNHN, Paris

Gabronthus thermarum Aube

DISTRIBUTION : anciennement réputé cosmopolite par confusion avec des espèces voisines. Connu certainement du Congo ex-belge, des Antilles et d'Europe probablement par importation.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, fumier de *Psalliota subedulis*, nombreux exemplaires montrant l'espèce dans son biotope (Pujol).

Mentophilonthus odzalaensis Levasseur

DISTRIBUTION : Congo (Brazzaville), type, Gabon.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, U.V., 1 ex. (Pujol et Teocchi).

Spatulonthus peregrinus Fauvel

DISTRIBUTION : toute l'Afrique noire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VI-1966, U.V., 3 ex. ; VII-1966, U.V., 1 ex. (Pujol et Teocchi).

Philonthus morio Boheman

DISTRIBUTION : du Sénégal au Cap.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, V-1966, U.V., 1 ex. ; VII-1966, U.V., nombreux exemplaires (Pujol et Teocchi).

Philonthus hospes Erichson

DISTRIBUTION : Sénégal, Gabon, Angola, Katanga, Madagascar.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, V-1966, U.V., 3 ex. ; VII-1966, U.V., nombreux exemplaires (Pujol et Teocchi).

Philonthus maculipennis Fauvel

DISTRIBUTION : Cameroun (Type), Gabon, Libéria, Côte-d'Ivoire, Katanga.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, coupes de *Cola cordifolia* (Cav.) R. Br., 2 ex., et de *Triplochiton scleroxylon* K. Schum., 2 ex. (Pujol).

Philonthus gabonensis Levasseur

DISTRIBUTION : Gabon (Type), Congo (Brazzaville), Cameroun, Sénégal, dont j'ai vu récemment 1 ♂ à élytres entièrement rougeâtres (Coll. J. Jarrige).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VI-1964, U.V., 1 ex. (Carayon); V-1966, U.V., 5 ex. ; VI et VII-1966, U.V., 3 ex. (Pujol et Teocchi).

Philonthus ventralis Gravenhorst

DISTRIBUTION : Cosmopolite, se prend régulièrement en Afrique noire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, U.V., 2 ex. (Pujol et Teocchi).

Philonthus burgeonianus Bernhauer

DISTRIBUTION : Côte-d'Ivoire, Congo ex-belge (Type), Katanga.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, U.V., 1 ex. ; VIII-1966, U.V., 2 ex. (Pujol et Teocchi).

Source MNHN, Paris

Philonthus lissonurus Tottenham

DISTRIBUTION : Côte-d'Ivoire, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo ex-belge (Type).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Boukoko, 2 ex. (Carayon).

Philonthus salti Tottenham

DISTRIBUTION : Uganda (Type), Congo ex-belge, Congo (Brazzaville), Cameroun.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, U.V., 1 ex. ; VIII-1966, U.V., 1 ex. (Pujol et Teocchi).

Philonthus ardoini Levasseur

DISTRIBUTION : Soudan (ex.-A.E.), type ♂ unique

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VI-1966, U.V., 5 ex. (Pujol et Teocchi).

Philonthus aemulus Tottenham

DISTRIBUTION : Sénégal, Nigeria, Cameroun, Congo (Brazzaville), Tanganyika (Type).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VI-1964, 1 ex. (Carayon) ; V-1966, U.V., 5 ex. (Pujol et Teocchi).

Philonthus balbus Tottenham

DISTRIBUTION · Uganda (Type), Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, V-1966, U.V., 15 ex. ; VII et VIII-1966, U.V., 130 ex. (Pujol et Teocchi).

Platydracus sjoestedti Fauvel

DISTRIBUTION : Cameroun (Type), Congo ex-belge.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, à terre en forêt, 1 ex. (Pujol et Teocchi).

Amelinus gestroi Bernhauer

DISTRIBUTION : Guinée portugaise (Type), Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, V-1966, U.V., 2 ex. (Pujol et Teocchi).

Glyphesthus niger Kraatz

DISTRIBUTION : Sénégambie (Type), Nigeria.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, V-1966, U.V., 2 ex. ; VII-1966, U.V., 2 ex. (Pujol et Teocchi).

Source MNHN, Paris

Sous-famille : *Tachyporinæ*

Coprotachinus congoensis Cameron

DISTRIBUTION : Congo ex-belge, Cameroun, Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, coupes de *Triplochiton scleroxylon* K. Schum., 30 ex. et de *Cola cordifolia* (Cav.) R. Br., 30 ex. (Pujol).

Tachinomorphus africanus Eppelsheim

DISTRIBUTION : de la Sierra-Leone à l'Abyssinie et du Congo (Brazzaville) au Natal.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, coupes de *Triplochiton scleroxylon* K. Schum., 3 ex. et de *Cola cordifolia* (Cav.) R. Br. 4 ex. (Pujol).

Coproporus diversicornis Eppelsheim

DISTRIBUTION : Côte-d'Ivoire, Togo, Cameroun, Congo (Brazzaville), ex-D.O. Afr.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, coupes de *Triplochiton scleroxylon* K. Schum., 90 ex. et de *Cola cordifolia* (Cav.) R. Br., 119 ex. (Pujol).

Sous-famille : *Aleocharinæ*

Typhloponemys alutaceus Wasmann

DISTRIBUTION : Congo ex-belge (Type), Katanga, Cameroun, Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, 28-VI-1966, dans une colonne de *Dorylus*, 18 ex. (Teocchi).

Typhloponemys alternans Cameron

DISTRIBUTION : Côte-d'Ivoire (Type), Ghana.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, 28-VI-1966, dans une colonne de *Dorylus*, 2 ex. (Teocchi).

Typhloponemys manni Kistner

DISTRIBUTION : Cameroun (Type).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, 28-VI-1966, dans une colonne de *Dorylus*, 8 ex. (Teocchi).

Mimocete fageli Kistner

DISTRIBUTION : Uganda, Congo ex-Belge (Type), Katanga.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, V-1964, 1 ex. (*Carayon*) ; V-1966, U.V., 3 ex. ; VII-1966, U.V., 3 ex. (Pujol et Teocchi).

Source MNHN, Paris

Anommatophilus kohli Wasmann

DISTRIBUTION : Tanganyika, Kenya, Congo ex-belge, Katanga, Angola, Cameroun, Côte-d'Ivoire, Libéria.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, 28-VI-1966, dans une colonne de *Dorylus*, 1 ex. (Teocchi).

Sympolemon anommatis Wasmann

DISTRIBUTION : Katanga, Congo ex-belge (Type), Cameroun, Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, dans une colonne de *Dorylus*, 23-VI-1966, 1 ex. ; 28-VI-1966, 11 ex. (Teocchi).

Caenonica granulicollis Cameron

DISTRIBUTION : Côte-d'Ivoire (Type).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, coupes de *Triplochiton scleroxylon* K. Schum., 7 ex. et de *Cola cordifolia* (Cav.) R. Br., 14 ex. (Pujol).

Caenonica aethiops Cameron

DISTRIBUTION : Congo ex-belge (Type), Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, coupes de *Triplochiton scleroxylon* K. Schum., 4 ex. et de *Cola cordifolia* (Cav.) R. Br., 7 ex. (Pujol).

Caenonica minuta Cameron

DISTRIBUTION : Côte-d'Ivoire (Type).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, coupe de *Triplochiton scleroxylon* K. Schum., 2 ex. (Pujol).

Homalota flavomaculata Bernhauer

DISTRIBUTION : Congo ex-belge (Type), Congo (Brazzaville), Cameroun, Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, coupe de *Triplochiton scleroxylon* K. Schum., 5 ex. (Pujol).

Dorylonilla spinipennis Wasmann

DISTRIBUTION : Congo ex-belge (Type), Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, 23-VI-1966, dans une colonne de *Dorylus*, 9 ex. (Teocchi).

Demera (Demerina) globosa Bernhauer

DISTRIBUTION : Congo ex-belge (Type), Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, 23-VI-1966, dans une colonne de *Dorylus*, 35 ex. (Teocchi).

Demera (Demerina) associata Cameron

DISTRIBUTION : Côte-d'Ivoire (Type).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, 23-VI-1966, dans une colonne de *Dorylus*, 25 ex. (Teocchi).

Source MNHN, Paris

Demera (Dorylophila) cavicollis Bernhauer

DISTRIBUTION : Guinée (Type), Côte-d'Ivoire, Nigeria.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, 23-VI-1966, dans une colonne de *Dorylus*, 7 ex. (Teocchi).

Demera (Dorylophilina) circularis Cameron

DISTRIBUTION : Congo ex-belge (Type), Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, 23-VI-1966, dans une colonne de *Dorylus*, 6 ex. (Teocchi).

Dorylopora costata Wasmann

DISTRIBUTION : Côte-d'Ivoire, Libèria, Cameroun, Congo ex-belge, Uganda, Kenya (d'après Kistner).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, 23-VI-1966, dans une colonne de *Dorylus*, très nombreux exemplaires (Teocchi).

Pachorhopala (s. str.) pujoli n. sp.

Espèce proche de *P. nitida* Bernhauer et décrite *infra*.

Pujolia (n. gen.) ***teocchii,*** n. sp.

Genre et espèce décrits *infra*.

Aenictonia (Anommatonia) schwabi Wasmann

DISTRIBUTION : Cameroun (Type), Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, dans une colonne de *Dorylus*, 23-VI-1966, 2 ex. ; 28-VI-1966, 2 ex. (Teocchi).

Aenictonia (Anommatochara) bicornis Wasmann

DISTRIBUTION : Congo ex-belge (Type), Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, 28-VI-1966, dans une colonne de *Dorylus*, 2 ex. (Teocchi).

Terrecorvonia pyroculata Last

DISTRIBUTION : Sénégal (Type), Uganda.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, V-1966, U.V., 2 ex. (Pujol et Teocchi).

Conradsia ganglbaueri Bernhauer

DISTRIBUTION : Tanganyika (Type), Cameroun, Katanga.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, 18-I-1966, U.V., 1 ex. (Pujol et Teocchi).

Zyras (Anophthalmodonia) artatus Last (description à paraître)

DISTRIBUTION : Je possède l'espèce du Katanga.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Mabokè, VII-1966, U.V., 1 ex. (Pujol et Teocchi).

Source MNHN, Paris

Zyras (Parophtalmonia) diversicollis Bernhauer

DISTRIBUTION : Katanga, Congo ex-belge (Type). Uganda. Cameroun.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Maboké, VII-1966. U.V., 3 ex. (Pujol et Teocchi).

Zyras (Parophthalmonia) acuticollis Bernhauer

DISTRIBUTION : Katanga, Congo ex-belge (Type), Congo (Brazzaville), Soudan (ex-A.E.), Nigeria, Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Maboké. VIII-1966, U.V., 5 ex. (Pujol et Teocchi).

Zyras (Parophthalmonia) arrowi Bernhauer

DISTRIBUTION : Rhodésie du Sud, Katanga. Angola (Type), Nigeria, Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Maboké, VI-1964, U.V., 1 ex. (Carayon); VII-1966. U.V., 3 ex. ; VIII-1966, U.V.. 3 ex. (Pujol et Teocchi).

Zyras (Acanthocnemedonia) manowensis Bernhauer

DISTRIBUTION : ex-D.O. Af. (Type), Katanga, Cameroun, Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Maboké, VIII-1966, U.V., 3 ex. (Pujol et Teocchi).

Zyras (Acanthocnemedonia) epilogus Last

DISTRIBUTION : Congo (Brazzaville), type, Cameroun.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Maboké, U.V., VII-1966, 2 ex. ; VIII-1966. 2 ex. (Pujol et Teocchi).

Zyras (Acanthocnemedonia) mutahilis Last (description à paraître)

DISTRIBUTION : Je possède l'espèce du Nigeria et de Côte-d'Ivoire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Carnot. IV-1962 (J. Mouchet) ; La Maboké, VII-1966, U.V.. 7 ex. (Pujol et Teocchi).

Zyras (Acanthocnemedonia) miricauda Bernhauer

DISTRIBUTION : Angola (Type), Katanga, Uganda, Côte-d'Ivoire, Cameroun.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Maboké, XII-1965, 1 ex. ; V-1966, U.V., 2 ex. (Pujol et Teocchi).

Zyras (Acanthocnemedonia) kafakumheanus Bernhauer

DISTRIBUTION : Congo (Brazzaville), type, Katanga, Cameroun, Sierra-Leone.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : La Maboké, V-1966, U.V., 1 ex. (Pujol et Teocchi).

Source MNHN, Paris

Pachorhopala *(s. str.)* ***pujoli,*** n. sp.

Ailé ; 4 mm. Tête brun rougeâtre foncé. Antennes brunâtres, les 2 premiers articles, la base du 3e et plus modérément le dernier, fortement éclaircis. Pronotum brun jaunâtre, le disque et la base souvent assombris. Elytres testacé foncé. Abdomen châtain, le 1er tergite visible et le liséré postérieur des suivants éclaircis. Pattes et pièces buccales testacées.

Tête transverse (35 × 23), régulièrement arrondie en arrière des yeux. Ceux-ci aussi longs que les tempes (11 × 11). Ponctuation quasi nulle sur la tête, réduite à quelques faibles points épars situés de part et d'autre de l'axe médian, lui-même totalement lisse. Antennes : voir figure.



Fig. 1. — *Pachorhopala* (s. str.) *pujoli*, n. sp. *a*) silhouette du pronotum ; *b*) méso et métasternum ; *c*) antenne ; *d*) édéage, face et profil.

Pronotum plus large que long (54 × 41,5) ayant sa plus grande largeur au milieu des côtés qui sont très régulièrement arrondis jusqu'à et y compris la base. Fossette basale nette, profonde. Le fond groupant 2 gros pores jointifs disposés horizontalement chez tous les exemplaires. Bourrelet postérieur peu indiqué, ne dépassant pas le milieu de chaque élytre. Ponctuation superficielle, plus forte au centre que sur les côtés, points écartés de 1 à 1,5 diamètre sur le disque, par ailleurs régulière.

Elytres sur la suture plus courts que le pronotum (40 × 41,5), pris ensemble plus larges que longs (67 × 40), élargis de la base au sommet (67 × 52). Angles postérieurs, vus de dessus, légèrement saillants en arrière du fait de la sinuation bien visible du bord distal de l'élytre. Ponctuation nette, profonde, points écartés de 1 à 1,5 diamètre sur le disque. Ecusson lisse Pièces mésosternales : voir figure. Pubescence générale courte et peu dense.

♂ : 6e tergite à sommet tronqué obliquement de part et d'autre de l'angle médian convexement largement obtus ; 6e sternite arrondi ; édéage : voir figure.

♀ : inconnue.

Type : 1 ♂, La Mabokè (République Centrafricaine), V à VI-1966, U.V., R. Pujol et P. Teocchi, déposé au Muséum, Paris.

Paratypes : 5 ♂, VI à VII-1966 mêmes localité, conditions et collecteurs.

Cette espèce prend place à côté de *Pachorhopala* (*s. str.*) *nitida* Bernhauer dont elle se distingue entre autres par ses élytres plus courts que le pronotum et l'aspect bien moins brillant.

Source MNHN, Paris

Genre **Pujolia**, nov. gen.

Tête trapézoïdale, sans cou distinct, insérée sous le pronotum. Fente buccale, vue de profil, atteignant environ le 1/3 antérieur du diamètre oculaire. Tempes rebordées sur toute leur longueur mais loin en arrière des yeux. Ceux-ci, non saillants, à facettes fines. Antennes avec les 4 premiers articles lisses (le 4ᵉ moins nettement), les suivants granuleux et ternes. Pièces buccales, antennes et pattes pas particulièrement allongées.



Fig. 2. — *Pujolia*, n. gen. *teocchii*, n. sp. *a*) labium et maxille ; *b*) labre ; *c* et *c'*) mandibules gauche et droite ; *d*) antennes ♂ et ♀ ; *e*) méso et métasternum ; *f*) silhouette du pronotum ; *g*) tête, profil ; *h*, *h'*, *h''*) tarses antérieur, médian, postérieur ; *i*) édéage, face et profil ; *j*) spermathèque ; *k*) 6ᵉ tergite et 6ᵉ sternite ♂ et ♀.

Labre peu transverse, à bord antérieur membraneux tri-ondulé ; angles antérieurs arrondis. Mandibules peu incurvées, pointues, toutes deux inermes. Palpes maxillaires de 4 articles, le 1ᵉʳ très court, le 2ᵉ peu incurvé, allongé, épaissi à l'apex, le 3ᵉ un peu plus long que le 2ᵉ ; 4ᵉ conique, plus étroit à la base que le 3ᵉ au sommet et d'environ la moitié de la longueur de celui-ci. Galea assez large avec une touffe de soies à l'apex, dépassant de fort peu la lacinia. Celle-ci porte

Source : MNHN, Paris

sur son bord interne quelques spinules recourbées suivies de l'habituelle frange de soies de plus en plus courtes et écartées en se rapprochant de la base. Mentum trapézoïdal à angles antérieurs légèrement proéminents, le bord antérieur entièrement et obliquement tronqué concavement de part et d'autre de l'angle médian largement obtus. Palpes labiaux de 3 articles. Le 1er très allongé, subparallèle, 3 fois plus long que large ; le 2e plus étroit et de moitié plus court que le 1er ; 3e subparallèle, aussi long que le 2e, tronqué droit à l'apex. Languette un peu plus longue que le 2e article des palpes labiaux, fendue jusqu'à la moitié en 2 lobes étroits soyeux à l'apex. Paraglosses très courts atteignant le 1/4 basal du 1er article des palpes labiaux.

Pronotum assez fortement convexe, avec une forte fossette devant l'écusson. Bords latéraux avec quelques grandes soies noires. Epipleures prothoraciques, vus de profil, visibles sur leur partie postérieure.

Elytres arrondis mais non sinués sur le bord distal. Bords latéraux avec quelques soies noires plus courtes que celles du pronotum.

Saillie mésosternale courte et large, tronquée concavement au sommet. Cavités coxales médianes entièrement fermées par une nette suture ; saillie métasternale bien délimitée, longue, étroite, tronquée droit à l'apex. Pièce intersternale très courte située au même niveau que les saillies méso et métasternale.

Abdomen atteignant sa plus grande largeur dès le 1er tergite visible, régulièrement mais modérément rétréci vers le sommet. 3 premiers tergites visibles sillonnés transversalement à la base. Paratergites normaux.

Tibias ciliés. Tarses de formule 4-5-5, longs des 2/3 des tibias. Antérieurs à 3 premiers articles décroissants en longueur, 4 = 1 + 2 + 3. Médians semblablement construits, 5 = 2 + 3 + 4. Postérieurs identiques 5 = 1.

Edéage à sac interne non flabellé.

Type du genre : *Pujolia teocchii*, n. sp.

De par ces caractères ce genre semble devoir prendre place parmi les *Zyrasini*, dans la sous-tribu *Athetæ*, au voisinage du genre *Allardiana* Mihi dont il diffère à première vue par la mandibule droite inerme, la conformation tout autre des tarses et par les 3 premiers tergites sillonnés à la base.

Pujolia teocchii, n. sp.

Ailé ; 5 mm ♂ à 7 mm ♀. Tête rougeâtre dans les 5 ♀, noire chez le ♂. Pronotum rougeâtre plus ou moins envahi de noir vers la base, entièrement noir chez le ♂. Elytres testacé jaunâtre avec les angles postéro-externes noirs, la tache allant des 2/5 antérieurs des côtés pour rejoindre en ligne droite le bord postérieur en un point situé tout près de l'angle sutural. Abdomen noirâtre, les lisérés antérieurs et postérieurs des tergites étroitement et les paratergites entièrement brunâtres. Pièces buccales rougeâtres (les 3 premiers articles des palpes maxillaires noirâtres chez le ♂). Antennes à 3 premiers articles rougeâtres, les suivants noirs. Pattes rougeâtres (3/4 distaux des fémurs obscurcis chez la ♀ du Togo et chez le ♂). Pas de microsculpture sur l'ensemble des téguments qui sont très luisants.

Tête subrectangulaire transverse : ♀, 47 × 35 = 1.34 ; ♂, 37 × 30 = 1.23. Clypeus relevé en bourrelet sur l'axe médian longitudinal. Yeux plus longs que les tempes (16 × 12). Rebord temporal fortement développé et se prolongeant sur tout le bord postérieur de la tête où il dessine une accolade, la pointe dirigée vers le pronotum. Antennes fortement différenciées sexuellement (voir figure), cylindriques. Petite fovéole, très peu visible à la pointe du triangle équilatéral formé par les

Source : MNHN, Paris

tubercules antennaires. Ponctuation quasi nulle sur l'axe médian longitudinal, composée par ailleurs de points peu profonds mais assez larges, écartés en moyenne de 2 diamètres (plus fins et plus épars chez le ♂). Pubescence noire assez longue, éparse, couchée, dirigée vers l'axe médian.

Pronotum transverse : ♀, 62 × 45 = 1.37 ; ♂, 45 × 35 = 1.28, ayant sa plus grande largeur au milieu des côtés. Angles antérieurs assez bien marqués, angles postérieurs totalement arrondis. Bourrelet postérieur lisse, bien marqué jusqu'aux épaules. Une forte fossette à fond ponctué devant l'écusson, en ovale transverse chez la ♀, ronde et plus petite chez le ♂. Ponctuation nulle sur l'axe médian qui est légèrement relevé en bourrelet chez la ♀, nette et profonde par ailleurs, où les points sont écartés irrégulièrement de 1 à 3 diamètres, bien moins bien imprimée et plus écartée chez le ♂. Pubescence comme sur la tête mais dirigée en arrière.

Elytres, mesurés sur la suture, écusson compris, un peu plus longs que le pronotum : ♀, 50 × 45 = 1.11 ; ♂, 40 × 35 = 1.14 ; pris ensemble plus larges que longs : ♀, 85 × 50 = 1.70 ; ♂, 65 × 40 = 1.62 ; élargis de la base au sommet : ♀, 65 × 85 = 1.30 ; ♂, 50 × 65 = 1.30. Angles postéro-externes à peine sinués. Echancrure de l'angle sutural assez prononcée. Ponctuation profonde, grosse, très nette, régulière chez la ♀ où les points sont écartés de 1 à 1,5 diamètre sur le disque. Chez le ♂ la ponctuation est plus irrégulière, ayant tendance à s'aligner en ondes transverses, bien plus serrée à la base qu'au sommet où elle devient d'abord éparse puis nulle. Ecusson ponctué à la base, lisse au sommet. Pubescence comme sur la tête.

Pièces mésosternales (voir figure) sur le même plan.

Abdomen avec les 3 premiers tergites visibles, sillonnés à la base, le 3e plus faiblement. Ponctuation existant sur tous les tergites des ♀, plus dense au sommet qu'à la base, nette et éparse, assez variable en force sur les exemplaires (dense et aciculée sur les tergites 4 5 et 6 de la ♀ du Togo), ponctuation nulle sur l'ensemble des tergites du ♂.

♂ : 6e tergite, 6e sternite et édéage : voir figure.

♀ : 6e tergite, 6e sternite et spermathèque : voir figure.

Type : 1 ♀, La Maboké (Rép. Centrafricaine), VI à VII-1966, U.V., Pujol et Teocchi, déposé au Muséum, Paris.

Paratypes : 1 ♂ (mutilé d'une antenne) et 5 ♀ (dont une en préparation microscopique) mêmes localité, conditions et collecteurs, VI à VII-1966 : 3 ex ; 8 à 20-VIII-1966 : 2 ex. ; 1 ♀, Château de Vial, Massif de Missahoué, 750 m, sud Togo, 16-VI-1963, *Me Schach* (E.N.S.).

Le faciès lourd et la coloration si spéciale, notamment des élytres, permet de reconnaître instantanément l'espèce (1)

(1) C'est pour moi une profonde joie de réunir ici les noms des deux chercheurs auxquels je dois tant de soirées d'agréable étude

Source MNHN, Paris